Interrogation 4

28 avril 2025

Exercice 1

Soit,

$$u_n = \frac{2n-1}{n(n^2-1)}, \quad v_n = \frac{\cos(3n\theta)}{4^n}, \quad d_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

avec $\theta \in \mathbb{R}$.

- 1. Étudier la nature des séries de termes généraux respectifs u_n, v_n, d_n . (3 pts)
- 2. Calculer la somme de la série de terme générale v_n . (1pt + 1 pt bonus)

Correction:

1. La série de terme général u_n est définie pour n > 1 (car n = 1 annule $n^2 - 1$). Pour n assez grand,

$$u_n = \frac{2n-1}{n(n^2-1)} \sim_{n\to\infty} = \frac{2}{n^2}.$$

Or, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (critère de Riemann), donc par équivalence, la série $\sum u_n$ converge.

La série de terme générale v_n est définie pour $n \geq 0$, elle alterne de signe à cause du $\cos(3\theta n)$. Étudions la convergence absolue : $\left|\frac{\cos(3\theta n)}{4^n}\right| \leq \frac{1}{4^n} = \left(\frac{1}{4}\right)^n$. La série $\sum_n \left(\frac{1}{4}\right)^n$ est une série géométrique convergente, donc par majoration la série de terme générale v_n converge absolument ce qui implique qu'elle converge simplement.

La série de terme générale d_n est définie pour n>0. Elle est à termes positifs. $\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}=e^{n^2\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)}=e^{n^2\left(-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}=e^{(-n+1/2+o(1))}\sim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{e}\right)^n$. $\sum_n\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{e}\right)^n$ est une série géométrique convergente. Donc par équivalence la série de terme générale d_n converge.

2. Soit N > 0, on a,

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{e^{3in\theta}}{4^n} = \sum_{n=0}^{N} \frac{\cos(3n\theta)}{4^n} + i \sum_{n=0}^{N} \frac{\sin(3n\theta)}{4^n}$$
 (1)

 $\sum_{n=0}^{N} \frac{e^{3in\theta}}{4^n}$ est une somme géométrique,

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{e^{3in\theta}}{4^n} = \sum_{n=0}^{N} \left(\frac{e^{3i\theta}}{4}\right)^n = \frac{1 - \frac{e^{3i(N+1)\theta}}{4^{N+1}}}{1 - \frac{e^{3i\theta}}{4}}$$
(2)

Or par le même argument que ci-dessus, toutes ces séries convergent donc on peut passer à la limite. De plus comme $\left|\frac{e^{3i(N+1)\theta}}{4^{N+1}}\right| \leq \frac{1}{4^{N+1}} \to_{N\to\infty} 0$, il s'ensuit que $\sum_{n=0}^N \frac{e^{3in\theta}}{4^n} \to_{N\to\infty} \frac{e^{3in\theta}}{4^n}$. Pour extraire la partie réelle de cette somme, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

$$\frac{4}{4 - e^{3i\theta}} = \frac{4}{4 - \cos(3\theta) - i\sin(3\theta)} \tag{3}$$

$$= \frac{4(4 - \cos(3\theta) + i\sin(3\theta))}{(4 - \cos(3\theta))^2 + \sin(3\theta)^2}$$
(4)

$$= \frac{4(4 - \cos(3\theta) + i\sin(3\theta))}{16 + \cos(3\theta)^2 - 8\cos(3\theta) + \sin(3\theta)^2}$$
 (5)

$$= \frac{4(4 - \cos(3\theta) + i\sin(3\theta))}{17 - 8\cos(3\theta)}$$
 (6)

$$=4\frac{4-\cos(3\theta)}{17-8\cos(3\theta)}+4i\frac{\sin(3\theta)}{17-8\cos(3\theta)}$$
 (7)

En identifiant la partie réelle et imaginaire de la limite, on a $\sum \frac{\cos(3n\theta)}{4^n} = 4\frac{4-\cos(3\theta)}{17-8\cos(3\theta)}$.

Exercice 2

Soit pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}$$

Soit pour tout $n \geq 2$,

$$v_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}$$

- 1. Calculer la limite de u_{n+1}/u_n lorsque n tend vers $+\infty$. (0.5pt)
- 2. Montrer que la suite (nu_n) est croissante. (0.5pt)
- 3. En déduire la nature de la série de terme général u_n . (1pt)
- 4. En supposant que pour $1 < \alpha < 3/2$, $(n+1)^{\alpha}v_{n+1} \le n^{\alpha}v_n$, déterminer la nature de la série de terme général v_n . (1pt)

Correction

- 1. Pour $n \ge 1$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n+2)} \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 \frac{1}{2n+2} \to_{n \to \infty} 1.$
- 2. Pour $n \ge 1$, $\frac{(n+1)u_{n+1}}{nu_n} = \frac{n+1}{n} \frac{2n+1}{2(n+1)} = \frac{2n+1}{2n} \ge 1$, par conséquent la suite (nu_n) est croissante.
- 3. Comme u_n est positive, on a $nu_n \ge u_1$, donc $u_n \ge \frac{u_1}{n}$. La série $\sum_n \frac{u_1}{n}$ est divergente par le critère de Riemann, donc par minoration la série de terme générale u_n est divergente.

4. Soit n_0 un rang à partir duquel l'inégalité est vraie. On a, pour $n > n_0$,

$$\frac{v_n}{v_{n_0}} = \frac{v_n}{v_{n-1}} \frac{v_{n-1}}{v_{n-2}} \dots \frac{v_{n_0+1}}{v_{n_0}} \\
\leq \frac{(n-1)^{\alpha}}{n^{\alpha}} \frac{(n-2)^{\alpha}}{(n-1)^{\alpha}} \dots \frac{n_0^{\alpha}}{(n_0+1)^{\alpha}} \\
\leq \frac{n_0^{\alpha}}{n^{\alpha}}$$

Ainsi, pour tout $n > n_0$, on a

$$v_n \leq v_{n_0} \cdot \frac{n_0^{\alpha}}{n^{\alpha}}.$$

Or, puisque $1 < \alpha < \frac{3}{2}$, la série $\sum \frac{1}{n^{\alpha}}$ converge d'après le critère de Riemann. Par conséquent, la série de terme général v_n converge par majoration.

Exercice 3

On considère l'équation différentielle,

(E):
$$y' + 2y = x^2 - 2x + 3$$
 $x \in \mathbb{R}$

- 1. Donner l'ensemble des solutions de (E). (1.5pt)
- 2. Que devient la solution si l'on impose la condition initiale y(0) = 3? (0.5pt)

Correction

1. Solution homogène : Soit l'équation homogène,

$$(E_0): y' + 2y = 0$$

Soit $\alpha: x \in \mathbb{R} \to 2$, une primitive de α est donnée par $A: x \in \mathbb{R} \to 2x$, donc l'ensemble des solutions homogène est donnée par $\{y_c: x \in \mathbb{R} \to Ce^{-2x} | C \in \mathbb{R}\}$. Solution particuliere Le second membre de (E) est un polynôme de degré 2.Donc on cherche une solution particulière y_p sous forme de polynome de degré 2.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad y_p(x) = ax^2 + bx + c$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ à déterminer. On a pour tout $x \in \mathbb{R}, y_p'(x) = 2ax + b$. On injecte dans l'equation (E) et on obtient,

$$2ax + b + 2(ax^{2} + bx + c) = x^{2} - 2x + 3$$
$$2ax^{2} + x(2a + 2b) + b + 2c = x^{2} - 2x + 3$$

Par identification, on trouve,

$$\begin{cases} a = 1/2 \\ b = -3/2 \\ c = 9/4 \end{cases}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E) est donné par,

$$\{y: x \in \mathbb{R} \to Ce^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{4}|C \in \mathbb{R}\}$$

2. Il suffit d'identifier les solutions vérifiant y(0) = 3. Pour tout $C \in \mathbb{R}, y(0) = C + \frac{9}{4}$ donc y(0) = 3 impose C = 3/4. L'unique solution de (E) vérifiant y(0) = 3 est donc donnée par,

 $y: x \in \mathbb{R} \to \frac{3}{4}e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{4}$